Algoritmo diagnostico



E lettura ragionata con l'OR

Algoritmo diagnostico

Test Meerssman senza deglutizione	Rulli cotone (>2,5mm)	– Occlusale – Muscolare – Funzionale	Test Posturodinamici
Test Meerssman con stimolo SPOT	Rulli cotone (>2,5mm)	– Occlusale – Muscolare	
Test OR	Odontorighello (<2mm)	– Occlusale – Funzionale	
Clack test	Schiocco SPOT	– Funzionale	
Stimolazione continua SPOT	Pressione SPOT con denti a contatto.	– Occlusale	

ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE

MUSCOLI MASTICATORI

OCCLUSIONE DENTALE

TEST DI MEERSSEMAN

TEST DI RIPROGRAMMAZIONE OCCLUSO-POSTURALE

MM.	RULLO	RECETTORI
1,5	M:0,8	SVINCOLO OCCLUSALE RECETTORI DENTO-PARODONTALI RECETTORI ARTICOLARI A.T.M.
2,0	M:0,8	
2,5	M:1,0	
3,0	M:1,0	SVINCOLO OCCLUSALE RECETTORI DENTO-PARODONTALI RECETTORI ARTICOLARI A.T.M. RECETTORI MUSCOLARI
3,5	M:1,2	
4,0	M:1,2	

ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE

MUSCOLI MASTICATORI

OCCLUSIONE DENTALE

TEST OR

TEST TONICO POSTURALE

	0,0	CONTATTO DENTALE	TEST DI RIFERIMENTO
FREEWAY SPACE	0,5	OR	SVINCOLO OCCLUSALE RECETTORI DENTO-PARODONTALI
	1,0	OR	

ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE

MUSCOLI MASTICATORI

OCCLUSIONE DENTALE

Posizionamento rulli e OR

TESTS OCCLUSO POSTURALI

Come posizionare i rulli nel
TEST DI RIPROGRAMMAZIONE

Come posizionare l'OR nel
TEST TONICO

ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE

MUSCOLI MASTICATORI

OCCLUSIONE DENTALE

Clack test

CLACK test
Esecuzione

Far seguire
test
posturodinamici

Test di dinamica
funzionale del rachide

le manovre posturodinamiche in sede cervicale, dorsale e lombare

L'operatore pone le sue mani in modo da toccare con i propri pollici le mastoidi (RC) o i muscoli paravertebrali (RD e RL) o le SIPS (bacino) invita il soggetto ad effettuare una lateroflessione e verifica se vi è una contestuale rotazione controlaterale. (Villeneuve Ph)

Lettura ragionata con l'Odontorighello

I parametri segnalabili nell'OR integrano la clinica e permettono l'orientamento verso le seguenti macro-diagnosi:

- Articolare (disordine temporo-mandibolare)
- Occlusale
- Muscolare
- Funzionale
- Altro: Lassità legamentosa, patologie articolari degenerative e/o reumatiche e cefalee

Articolare:

Possiamo trovare una o più delle seguenti misurazioni o segnalazioni:

A) Limitazione dell'apertura della bocca;

B) Limitazione in protrusione;

C) Limitazione nella lateralità;

D) Endfeel rigido sulle 4 direzioni (apertura, protrusione, lateralità destra e sinistra);

E) Traiettorie patologiche (deviazione o deflessione);

F) "Click" articolare in apertura e/o chiusura e/o reciproco;

G) Deviazione della mediana.

Occlusale:

Possiamo trovare una o più delle seguenti misurazioni patologiche:

A) Overjet;

B) Overbite (morso chiuso o aperto);

C) Deviazione della mediana.



Muscolare:

Possiamo trovare una o più delle seguenti segnalazioni:

A) Test muscolari;

B) Test di provocazione;

C) Endfeel elastico sulle 4 direzioni (apertura, protrusione, lateralità destra e sinistra).



Funzionale:

Possiamo trovare una delle seguenti misurazioni o segnalazioni:

A) Frenulo linguale patologico;

B) Deglutizione atipica (o mista);

C) Overbite (Morso aperto);

D) Overjet.

Parafunzionale

Possiamo trovare sull'OR la segnalazione di:

A) Bruxismo tipo 1 o tipo 2



lassità legamentose (collagenopatia):

Possiamo trovare una o più delle seguenti misurazioni o segnalazioni:

A) Apertura oltre 5,5cm;

B) “Click” articolare parafisiologico;

C) Traiettoria (deflessione oltre 5,5).

Cefalee:

Possiamo trovare la seguente segnalazione:

A) Test di provocazione (KROGH-POULSEN) in posizione di bruxismo;

B) Test muscolari.

Patologie articolari degenerative:

A) Rumori articolari